

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

ARBO. VITI. RHONE-ALPES

ABONNEMENT ANNUEL: 90f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

8 Août 1984

N° de série continue 284

Bulletin n° 16

ARBRES FRUITIERS

=====

CARPOCAPSE

Le 2e vol a débuté les tout derniers jours de juillet dans la plupart des situations. En conséquence, la lutte est à reprendre en toutes régions sauf dans les zones d'altitude des Monts du Lyonnais et du Plateau des Bornes (région de Groisy, Hte-Savoie) :

- à l'aide de diflubenzuron (Dimilin) dès réception ;
- à l'aide des produits larvicides classiques, dès le 13 Août.

La liste des produits homologués a été donnée dans notre Bulletin n° 12 du 21 juin. A cette liste, il convient d'ajouter l'association suivante :

- chlorpyrifos-éthyl + diméthoate (Finétyl D, Salut) à la dose du fabricant

CARPOCAPSE DES PRUNES

Dans les zones affectées par cet insecte, les captures sont restées constamment abondantes, laissant penser que les 2 vols se sont chevauchés. Il n'y aura donc pas d'interruption dans la protection.

TORDEUSE ORIENTALE

Maintenir la protection en tenant compte des délais d'emploi avant récolte.

ACARIENS

De nombreux vergers sont encore attaqués par ce parasite. Renouveler le traitement si besoin est en alternant les produits.

VIGNE

=====

TORDEUSES DE LA GRAPPE

Le développement de la 2e génération est resté très limité.

Le renouvellement du traitement, 12 à 15 jours après le précédent (selon les produits), ne se justifie que dans les quelques zones où l'on trouve plus de 10 % de grappes attaquées (présence de larves vivantes à l'intérieur des grains).

Dans ce cas, traitez avec un insecticide doté d'une bonne action en profondeur, ce qui exclut les pyréthrinoides de synthèse.

Rappel : Une lutte efficace contre les Tordeuses limite le développement de la Pourriture Grise.

7498

OIDIUM

Maintenir la protection jusqu'à la véraison.

MILDIU

La situation reste saine.

Un renouvellement de la protection ne se justifiera qu'en cas de période orageuse ou pluvieuse prolongée.

BOTRYTIS

Les risques restent assez faibles.

La prochaine période d'intervention possible se situera en début de véraison. Selon l'évolution des risques, nous vous indiquerons le type de produit à utiliser.

ACARIENS

Les conditions climatiques leur restent très favorables **SURVEILLEZ** toujours leur développement et intervenez si plus de 50 % des feuilles sont attaquées (voir Bulletin du 13 juillet).

CICADELLES

Leur cycle de développement se poursuit.

MAINTENEZ LA SURVEILLANCE (présence de larves sous les feuilles, taches rouges en bordure des feuilles) et intervenez en cas de forte infestation (voir Bulletin du 23 juillet).